

Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

(Fortsetzung.)

Quedius punctatellus Heer: 28. 7. 1954, 1. 8. 1954, 20. 10. 1954, 13. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Quedius dubius Heer ssp. *fimbriatus* Er.: 6. 9. 1953, 3. 8. 1954, 19. 9. 54 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m geködert; 6. 9. 1953, 8. 9. 1953, 28. 7. 1954, 30. 7. 1954, 3. 8. 1954, 12. 6. 1955, 23. 8. 1955, 21. 9. 1955, 15. 10. 1955 ebenda ca. 1500—1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 30. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 26. 6. 1954, 10. 7. 1955 etwas oberhalb Plankensteintsee in Richtung Plankenstein ca. 1600 m unter Steinen; 18. 8. 1955, 22. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht, 21. 8. 1955, 22. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955 ebenda von *Senecio Fuchsii* geklopft.

Quedius ochropterus Er.: 3. 9. 1953, 23. 7. 1954, 1. 8. 1954, 18. 8. 1954, 21. 9. 1955, 12. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 bis 1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 27. 7. 1954, 15. 10. 1955 ebenda geködert und 5. 6. 1955 an einer etwas östlich gelegenen Stelle unter Steinen; 26. 6. 1954 Plankensteinahn ca. 1400 m aus einem morschen Bergahorn gesiebt.

Quedius umbrinus Er.: 22. 9. 1955, 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Quedius maurovufus Grav.: 19. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m in der Streu- und Bodenschicht.

Quedius nemoralis Baudi: 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Quedius alpestris Heer: 6. 9. 1953, 28. 7. 1954, 30. 7. 1954, 1. 8. 1954, 20. 8. 1954, 24. 8. 1954, 8. 9. 1954, 20. 10. 1954, 21. 10. 1954, 22. 10. 1954, 21. 9. 1955, 13. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 bis 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 30. 3. 1954, 21. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht.

Quedius Haberfelneri Epp.: 22. 9. 1955, 12. 10. 1955, 15. 10. 1955, 17. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Quedius paradisiannus Heer: 2. 8. 1954, 4. 8. 1954, 5. 8. 1954, 21. 10. 54, 9. 5. 1955, 10. 5. 1955, 7. 6. 1955, 22. 9. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m in der Streu- und Bodenschicht; 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert, 16. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 6. 9. 1953, 18. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang in der Streu- und Bodenschicht; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter Steinen; 18. 8. 1955, 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht. Häufig.

Quedius hoops Grav.: 18. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Mycetoporus brunneus Marsh.: 7. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1610 m in der Streu- und Bodenschicht.

Mycetoporus niger Fairm.: 12. 10. 1955, 13. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Tachyporus nitidulus F.: 7. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1610 m in der Streu- und Bodenschicht.

Tachyporus ruficollis Grav.: 20. 10. 1954, 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Tachyporus chrysomelinus L.: 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter Steinen; 12. 7. 1955 am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Tachyporus solutus Er.: 9. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht.

Tachinus proximus Kr.: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1550 m in Pilzen; 30. 6. 1954, 20. 10. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m in Hirschlosung; 30. 7. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m geködert; 28. 7. 1954, 3. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht.

Tachinus pallipes Grav.: August 1953 Setzberg ca. 1700 m unter Steinen; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m in Hirschlosung; 4. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m in der Streu- und Bodenschicht; 5. 7. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1570 m geködert.

Tachinus rufipes Deg.: 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m in Hirschlosung.

Tachinus laticollis Grav.: 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 16. 6. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

Leptusa pulchella Mannh.: 2. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Leptusa ruficollis Er.¹⁾: 31. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1500 m aus Moos gesiebt.

Leptusa globulicollis Rev.: 6. 9. 1953, 7. 9. 1953, 28. 7. 1954, 1. 8. 1954, 20. 10. 1954, 21. 10. 1954, 22. 10. 1954, 23. 8. 1955, 21. 9. 1955, 12. 10. 55, 13. 10. 1955, 15. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 bis 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 22. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Leptusa Würndlei Scheerp.¹⁾: 31. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1500 m aus Moos gesiebt; 5. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1660 Meter von der Wiese gestreift.

Dadobia immersa Er.: 28. 5. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1700 m unter der Rinde abgestorbener Legföhren.

Sipalia circellaris Grav.: 30. 3. 1954, 14. 5. 1954, 9. 6. 1954, 5. 8. 1954, 25. 8. 1954, 26. 8. 1954, 7. 9. 1954, 19. 10. 1954, 21. 10. 1954, 10. 5. 1955, 7. 6. 1955, 18. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m in der Streu und Bodenschicht. Hier sehr häufig.

Atheta melanocera Thoms., Joy²⁾: 8. 9. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen, 12. 7. 1955 ebenda im Angeschwemmten; 7. 6. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht; 12. 6. 1955, 23. 8. 1955, 21. 9. 1955, 12. 10. 1955, 13. 10. 1955, 15. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 bis 1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 18. 9. 1955, 19. 9. 1955, 20. 9. 1955, 22. 9. 1955, 13. 10. 1955, 15. 10. 1955, 17. 10. 1955 ebenda geködert; 22. 8. 1955, 22. 9. 1955, 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht. Sehr häufig.

Atheta tibialis Heer: 12. 5. 1954 Röthenstein ca. 1600 m geködert; 24. 6. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 14. 5. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht; 6. 9. 1953, 8. 9. 1953, 8. 9. 1954, 18. 9. 1954, 19. 9. 1954, 21. 9. 1955, 13. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m in der Streu-

¹⁾ det. Prof. O. Scheerpeltz

²⁾ Sämtliche Atheten det. Dr. G. Benick

und Bodenschicht; 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht, 20. 9. 1955 ebenda unter Steinen; 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 22. 8. 1955, 22. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht. Sehr häufig.

Atheta monticola Thoms.: 11. 9. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1580 m in der Streu- und Bodenschicht.

Atheta spatula Fauv.: 7. 9. 1954, 22. 8. 1955, 26. 8. 1955, 17. 9. 1955; 19. 9. 1955, 20. 9. 1955, 22. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert. Hier sehr häufig.

Atheta depressicollis Fauv.: 11. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert; 22. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Atheta excelsa Bernh.: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Atheta amicula Steph.: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1550 m in Pilzen; 11. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Atheta subtilis Scriba: 1. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m geködert; 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1570 m geködert.

Atheta boreella Brund.: 1. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m geködert; 5. 7. 1955, 11. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert; 22. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Atheta nigricornis Thoms.: 5. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert.

Atheta gagatina Baudi: 26. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Atheta fungicola Thoms.: 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Atheta diversa Shp.: 12. 6. 1955, 14. 6. 1955, 16. 6. 1955, 5. 7. 1955, 13. 7. 1955, 12. 10. 1955, 15. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m geködert, 5. 6. 1955 ebenda unter Steinen; 15. 6. 1955, 5. 7. 1955, 21. 8. 1955, 19. 9. 1955, 22. 9. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 5. 7. 1955, 13. 7. 1955, 26. 8. 1955, 17. 9. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Atheta contristata Kr.: 12. 5. 1954, 13. 5. 1954, 4. 6. 1954, 11. 6. 1954, 17. 8. 1955, 12. 10. 1955, 13. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 4. 6. 1954, 10. 6. 1954, 12. 6. 1954, 5. 6. 1955, 12. 6. 1955, 16. 6. 1955, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 13. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m geködert; 26. 8. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert. Sehr häufig, bevorzugt altes Aas.

Atheta brunneipennis Thoms.: 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert; 12. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m geködert; 22. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Atheta pagana Er.: 6. 10. 1953, 30. 7. 1954, 3. 8. 1954, 20. 8. 1954, 24. 8. 1954, 8. 9. 1954, 23. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 bis 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 22. 8. 1955, 22. 9. 1955, 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht. An diesen beiden Stellen sehr häufig.

Atheta Wüsthoffi G. Ben.: 22. 8. 1955, 22. 9. 1955, 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Fortsetzung folgt.